

Informatie voor patiënten

Uw arts heeft u Seroquel® (quetiapine) voorgeschreven. In deze brochure staat informatie over het geneesmiddel Seroquel, waar het middel voor bedoeld is en de bijwerkingen die mogelijk kunnen optreden.

De informatie in deze brochure vervangt niet de adviezen van uw behandelend arts of van de bijsluitertekst. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze brochure dan kunt u deze stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Met dank voor de medewerking:

Dr. E.M. van Gent, neuropsychiater

GGNet, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Wat is Seroquel en hoe werkt het?

Seroquel is een modern (atypisch) antipsychoticum en een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie en bij de manische periode behorende bij een bipolaire stoornis. Seroquel vermindert de klachten die gepaard gaan met uw aandoening.

Seroquel behoort tot de groep van atypische antipsychotica dat voorgeschreven wordt aan meer dan 8 miljoen mensen in vele landen. Seroquel is sinds 1997 verkrijgbaar en wordt sinds 1989 uitgebreid onderzocht.

Seroquel zorgt voor een beter evenwicht van dopamine en serotonine, waardoor klachten behorende bij de ziekte verminderen. Seroquel valt binnen de groep van atypische antipsychotica doordat het, in vergelijking met de oudere (klassieke) antipsychotica, minder kans geeft op de vervelende bijwerkingen, zoals bewegingstoornissen.

Bij welke symptomen schrijft de arts Seroquel voor?

Seroquel wordt gebruikt bij de behandeling van: schizofrenie en matig tot ernstig manische periode behorende bij een bipolaire stoornis.

Symptomen die bij deze aandoeningen voorkomen zijn onder andere:

- Hallucinaties
- Wanen
- Verward spreken en denken
- Verandering in gedrag
- Gebrek aan initiatief
- Lusteloosheid
- Opwinding
- Slapeloosheid
- Snel praten en bewegen
- Agressie of irritatie
- Depressieve gevoelens
- Angst
- Spanning

Hoe ziet Seroquel eruit?

Seroquel is te verkrijgen in tablet vorm met de doseringen: 25, 100, 200 en 300 mg.



25 mg



100 mg



200 mg



300 mg

Wanneer kan ik Seroquel innemen en hoe vaak per dag moet ik het slikken?

Seroquel kan zonder of met voedsel worden ingenomen. Het is wel raadzaam om de tabletten met een klein beetje water geheel door te slikken. Omdat Seroquel 2 maal daags moet worden ingenomen is het handig om het op twee vaste tijdstippen in te nemen, bijvoorbeeld in de ochtend en in de avond voor het slapengaan.

Wat moet ik doen wanneer ik vergeten ben Seroquel in te nemen?

U behoort uw tabletten in te nemen volgens het voorschrift van uw arts. Het kan wel eens gebeuren dat u een dosis vergeet. Neem dan deze dosis in op het moment dat u er aan denkt, echter neem deze niet tegelijkertijd met de volgende dosis. Daarna kunt u het gebruikelijke schema hervatten.

Indien u meer dan uw normale dosis inneemt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet ik doen als ik wil stoppen met Seroquel?

Als u wilt stoppen met Seroquel, praat hier dan over met uw arts. Stop niet op eigen gelegenheid met innemen van Seroquel. Uw arts kan u het beste adviseren hierover en aangeven wat de risico's zijn.

Na hoeveel tijd begint Seroquel te werken?

Het kan enige dagen duren voordat Seroquel gaat werken. Uw arts kan daar meer informatie over geven. Mochten de klachten niet meteen verdwijnen, dan is het niet verstandig om te stoppen met Seroquel of zelfstandig de dosering te verhogen. Neem in dat geval altijd contact op met uw arts. Mochten de klachten verdwijnen of minder worden, dan is het van belang dat u de medicatie door blijft slikken omdat anders de klachten weer terug kunnen komen. Wilt u toch stoppen of de dosering veranderen neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts en stop nooit met uw medicatie op eigen gelegenheid.

Komen er bijwerkingen voor bij het gebruik van Seroquel?

Seroquel wordt over het algemeen goed verdragen. Het is echter niet te voorspellen of u last krijgt van bijwerkingen. Meest voorkomende bijwerkingen zijn slaperigheid (is veelal van voorbijgaande aard); versnelde hartslag; droge mond (te verlichten door dagelijks voldoende vocht, bij voorkeur geen zoete dranken); een licht verstoorde spijsvertering of verstopping; te kort aan witte bloedlichaampjes; slapeid in armen en benen; vochtophoping; lichte gewichtstoename; verstopte neus en bloeddrukdaling, waarbij mogelijk kan optreden, duizeligheid, verhoogde hartslag en verlies van bewustzijn. (Door 's ochtends rustig op te staan en eerst op de rand van het bed te gaan zitten heeft u minder last van het duizelige gevoel).

Mocht u last hebben van één van deze bijwerkingen of bijwerkingen die niet genoemd zijn, meldt dit aan uw arts en overleg met uw arts of u stappen en, zo ja, welke stappen u moet ondernemen. Het is niet verstandig om zonder vooraf overleg met uw arts Seroquel te stoppen of minder tabletten in te nemen.

Welke andere medicijnen kan ik gebruiken naast Seroquel?

Uw arts of apotheker weet welke (genees)middelen gelijktijdig met Seroquel kunnen worden gebruikt. Als u een nieuw geneesmiddel krijgt voorgeschreven, bespreek dan met uw arts of apotheker dat u al Seroquel gebruikt.

U mag Seroquel niet gelijktijdig gebruiken met stoffen die het zogenaamde 'cytochroom P450' enzym remmen, zoals HIV-proteaseremmers (tegen AIDS), antischimmelmiddelen uit de azol-groep (zoals bijvoorbeeld ketoconazol), de geneesmiddelen erytromycine of claritromycine (macrolide-antibiotica) of nefazodon (een antidepressivum).

Voordat u begint met het gebruiken van Seroquel is het van belang om uw arts op de hoogte te stellen wanneer u:

- Andere geneesmiddelen gebruikt of hiermee gaat stoppen, inclusief de middelen die u heeft gekocht.
- Uw arts of apotheker op de hoogte te stellen of u middelen gebruikt tegen angst, depressie of epilepsie (zoals bv. fenytoïne of carbamazepine) of hoge bloeddruk, maar ook wanneer u gaat stoppen om deze middelen te slikken.

Wat moet ik doen wanneer ik overstap van een ander geneesmiddel naar Seroquel?

Uw arts zal u volledig informeren hoe u het ene medicijn afbouwt terwijl u overstapt naar Seroquel.

Welke voorzorgen moet ik nemen voordat ik ga beginnen met Seroquel?

Het is verstandig om aan uw arts of apotheker te melden welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Voordat u begint met Seroquel is het belangrijk om uw arts op de hoogte te stellen wanneer u last heeft van:

- Problemen met uw hart of lever of wanneer u een beroerte heeft gehad.
- Wanneer u weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad.
- Epileptische aanvallen (toeval).
- Te hoog suikergehalte in het bloed of wanneer op basis van uw familiegeschiedenis de kans op diabetes(suikerziekte) aanwezig is.

Let op:

- Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, dient u het medisch personeel te informeren dat u Seroquel slikt.
- U dient voorzichtig te zijn met de hoeveelheid alcohol die u drinkt. Het gecombineerde effect van Seroquel en alcohol kan u slaperig maken.
- Uw tabletten kunnen u een slaperig gevoel geven. Dit verdwijnt meestal tijdens voortzetting van het innemen van uw tabletten. U kunt beter geen voertuigen besturen of machines bedienen, totdat u weet wat voor invloed deze tabletten op u hebben.
- Het wordt afgeraden Seroquel samen met grapefruitsap in te nemen.

Heb ik bij het gebruik van Seroquel nog extra controles nodig?

Indien u Seroquel gebruikt, is het niet nodig om extra controles te doen.

Wanneer moet ik mijn arts waarschuwen?

- Wanneer u zwanger bent of wilt worden.
- Wanneer uw klachten verergeren of indien er nieuwe klachten bijkomen.
- Wanneer u last krijgt van bijwerkingen of de bijwerkingen verergeren.
- Plotselinge koorts, spierstijfheid, verwardheid.
- Als door een andere arts medicatie wordt voorgeschreven (dit kunt u ook met uw apotheker bespreken).

Als ik op vakantie ga, waar moet ik dan aan denken?

Het is verstandig om een dubbele hoeveelheid medicatie evenredig te verdelen over de handbagage en de koffers die worden ingecheckt. Bewaar de tabletten altijd in de oorspronkelijke verpakking en haal ze dus niet uit de doordrukstrips. Laat door uw arts ook een begeleidende brief invullen waarbij aangegeven wordt dat u uw medicatie nodig hebt. U kunt ook de kaart achterin de brochure gebruiken.

Hoe moet ik Seroquel bewaren

Bewaren beneden 30° C in de originele verpakking.

Indien uw arts besluit de behandeling te staken, draag dan zorg voor een juiste afvalverwerking van de overgebleven tabletten. U kunt deze bijvoorbeeld inleveren bij uw apotheek. Gebruik uw tabletten niet na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze wordt op de verpakking vermeld en ook op de doordrukstrip achter de letters 'exp'. Draag ook dan zorg voor een juiste afvalverwerking, en lever uw tabletten bijvoorbeeld bij uw apotheek in. Bewaar uw Seroquel tabletten op een veilige plaats buiten het zicht en buiten het bereik van kinderen. Uw medicijnen kunnen schadelijk voor hen zijn.

Certificate:

The undersigned, treating physician, declares that this patient while traveling abroad possesses the following medication and injection equipment, which are necessary for treatment.

Verklaring:

Ondergetekende, behandelend arts, verklaart hierbij dat genoemde patiënt gedurende het verblijf in het buitenland in het bezit is van de hieronder genoemde medicijnen en injectiebenodigdheden, die nodig zijn voor zijn/haar behandeling.

Attestation:

Le soussigné, médecin traitant, atteste que le patient identifié ci-dessous, en raison d'un séjour l'étranger, est en possession des médicaments et du matériel d'injection suivantes, nécessaire à son traitement :

Ärztliches Attest:

Der unterzeichnende Arzt erklärt, dass der betreffende Patient während seiner Auslandsreise folgende Medikamente und folgendes Injektionsbesteck mit sich führt, Welche Behandlungszwecken dienen.

Declaración:

El abajo firmante, médico responsable, declara que este paciente, durante su viaje al extranjero, está en posesión de los medicamentos y el material de inyección siguientes, necesarios para su tratamiento.

Beyanname:

Aşağıda imzası bulunan, tedaviyi yapan doktor, bu hastanın tedavisi için aşağıdaki ilaç ve enjeksiyon malzemesini seyahat ederken yanında bulundurması gerektiğini deklare eder.

شهادة
ان الموقوع أدناه، الطبيب المعالج، يشهد أن المريض المذكور يملك أثناء إقامته بالخارج الأدوية
الموصوفة أدناه وبمستلزمات الحقن المذكورة حيث أنها ضرورية لعلاج المريض.

Name / Naam / Nom / Name / Nombre / Isim / الاسم .

Date of Birth / Geboortedatum / Date de naissance / Geburtsdatum / Fecha de nacimiento / Doğum Tarihi / تاريخ الولادة :

Description of medicine(s) and injection equipment
Omschrijving medicijnen en injectiebenodigheden
Description des médicaments et du matériel d'injection
Medikamente und Injektionsbesteck
Descripción de los medicamentos y el material de inyección
İlaç(lar) ve enjeksiyon malzemesinin tanımı
وصف الأدوية

Physician / Arts / Médecin / Arzt / Médico / Doktor / الطبيب .

Name and address / Naam en adres / Nom et adresse / Name und Anschrift / Nombre y dirección / Isim ve Adres /
الاسم والعنوان :

Date / Datum / Date/ Datum / Fecha / Tarih / التاريخ .

AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer
tel. (079) 363 22 22, www.astrazeneca.nl